

Insinöörimatematiikka X 5**Tentti 01.02.2010**

Ei laskimia, taulukkokirjoja tai muuta kirjallisuutta. Kaavakokoelma käänköpuolella.

1. Olkoon R kolmio kärkipisteinään $(0, 0)$, $(0, 1)$ ja $(3, 1)$.

(a) Jos R kuvailee tasapaksua levyä, mikä on massakeskipisteen x -koordinaatti?

(b) Laske

$$\iint_R \frac{x}{y^3 + 1} da.$$

Huom. Integrointijärjestys vaikuttaa suuresti laskun helppouteen.

2. Paraboloidista $z = x^2 + y^2 - 3$ leikataan kappale S siten, että leikkauuspintoina ovat tasot $z = -2$ ja $z = 1$. Laske kappaleen S tilavuus.

3. Ratkaise differentiaaliyhtälö

$$y'' + 2y' + y = e^{-3x}.$$

4. Ratkaise alkuarvoprobleema

$$\begin{cases} y'_1 = y_1 + 2y_2 \\ y'_2 = 5y_1 + 4y_2 \end{cases},$$

kun $y_1(0) = 3$ ja $y_2(0) = 4$

MAT-1035X Insinöörimatematiikka 5 / vihjeitä

1. $\iint_{R_{xy}} f(x,y) dx dy = \iint_{R_{uv}} f(x(u,v), y(u,v)) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv$

2. $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \cdot \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = 1$

3. $m = \iint_R \rho(x,y) da, \quad J = \iint_R d(x,y)^2 \rho(x,y) da$
 $x_0 = \frac{1}{m} \iint_R x \rho(x,y) da, \quad y_0 = \frac{1}{m} \iint_R y \rho(x,y) da$

4. $\begin{cases} x = \rho \sin \phi \cos \theta \\ y = \rho \sin \phi \sin \theta \\ z = \rho \cos \phi \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\phi,\theta)} = \rho^2 \sin \phi$

5. $\frac{dy}{dx} + a(x)y = f(x); \quad y = e^{-\int a(x) dx} \left(\int f(x)e^{\int a(x) dx} + C \right), \quad A'(x) = a(x)$

6. $y(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$

$$\begin{cases} c_1'(x)y_1(x) + c_2'(x)y_2(x) = 0 \\ c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x) = f(x) \end{cases}$$

7. $a \cos \omega t + b \sin \omega t = A \sin(\omega t + \phi)$

$A = \sqrt{a^2 + b^2}$ ja $\cos \phi = \frac{b}{A}$, $\sin \phi = \frac{a}{A}$ eli $\phi = \arctan \frac{a}{b}$ ($\pm \pi$)

8. $f(x) = c e^{\alpha x}$
 $y(x) = K e^{\alpha x} \quad \text{jos } \alpha \text{ ei ole kar. yhtälön juuri}$

$y(x) = K x e^{\alpha x} \quad \text{jos } \alpha \text{ on kar. yhtälön 1-kertainen juuri}$
 $y(x) = K x^2 e^{\alpha x} \quad \text{jos } \alpha \text{ on kar. yhtälön 2-kertainen juuri}$

9. $y'' + \omega^2 y = p \cos \omega x + q \sin \omega x$
 $y(x) = Ax \cos \omega x + Bx \sin \omega x, \quad A = -\frac{q}{2\omega}, \quad B = \frac{p}{2\omega}$

10. $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$

(i) yksinkertainen reaalijuuri λ_1 ; ratkaisu $e^{\lambda_1 x}$

(ii) yksinkertainen imaginaarijuuripari $\alpha \pm j\beta$; ratkaisut

$$e^{\alpha x} \cos \beta x \quad \text{ja} \quad e^{\alpha x} \sin \beta x$$

(iii) k-kertainen reaalijuuri λ_1 , ratkaisut

$$e^{\lambda_1 x}, \quad x e^{\lambda_1 x}, \quad x^2 e^{\lambda_1 x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda_1 x}$$

(iv) k-kertainen imaginaarijuuripari $\alpha \pm j\beta$, ratkaisut

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad x e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad x e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x} \sin \beta x$$

11. $\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{b}(t) \quad \dots \quad \mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c} + \mathbf{x}_p(t)$

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t}, \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t}, \dots, \mathbf{v}_n e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

$\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta, \quad \mathbf{w}_{1,2} = \mathbf{u} \pm j\mathbf{v} \quad \dots, \quad \text{Re}\{\mathbf{w}_1 e^{\lambda_1 t}\}, \quad \text{Im}\{\mathbf{w}_1 e^{\lambda_1 t}\}$

12. $\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + e^{\lambda t} \mathbf{K} \quad \dots \quad \mathbf{x}(t) = e^{\lambda t} \mathbf{v} \quad \dots \quad (A - \lambda I)\mathbf{v} = -\mathbf{K}$

13. Integrointikaavojat:

$$\int f(g(t))g'(t) dt = F(g(t)), \quad F' = f, \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)|$$

$$\int u(x) \underbrace{v'(x) dx}_{dv(x)} = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx$$