

73040 VEKTORIANALYYSI (K,Te,Tu,M,R,Tj,Y)

1. VÄLITENTTI 13.10.2003


Vastaa erilliselle paperille. Laita jokaiseen vastauspaperiin nimesi, opiskelijanumerosi ja koulutusohjelmasi. Kaavakokoelma kääntöpuolella.

1. Kappaleen S pallokoordinaatit ovat

$$0 \leq \rho \leq R, \quad \pi/6 \leq \phi \leq \pi/4, \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

Valitse jokin sellainen luku $R \in \mathbb{N}$, että kappaleen S tilavuus on välillä $[30, 50]$. Hahmottele kuva tästä kappaleesta xyz -koordinaatistossa.

Voit käyttää laskuissasi yhden desimaalin tarkkuutta. Joitakin likiarvoja, joita saatat tarvita: $\pi = 3.1$, $\sqrt{2} = 1.4$, $1/\sqrt{2} = 0.7$, $\sqrt{3} = 1.7$, $1/\sqrt{3} = 0.6$. Alla myöskin kuvio, josta voi olla apua tehtävässä tarvittavien arvojen laskemisessa.



2. Laske kappaleen

$$S = \{(x, y, z) : x \geq 1, -e^{-x} \leq y \leq e^{-x}, 0 \leq z \leq 2\}$$

massa, kun tiheysfunktio $\rho(x, y, z) = e^{-2x}$. Jos tämä epäoleellinen integraali ei suppene, niin osoita sen hajaantuminen.

3. Kappale siirtyy tasossa pisteestä $(1, 0)$ pisteeseen $(0, 2)$ pitkin paraabelia $y = -2x^2 + 2$. Tämän jälkeen kappale jatkaa matkaansa pisteestä $(0, 2)$ origokeskisen ympyrän kaarta kaksi kierrosta vastapäivään. Laske työntegraalin

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

arvo, missä C on edellä kuvattu reitti ja $\mathbf{F} = (-x, -y)$.

$$1. \iint_{R_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{R_{uv}} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

$$2. \begin{cases} x = \rho \sin \phi \cos \theta \\ y = \rho \sin \phi \sin \theta \\ z = \rho \cos \phi \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \phi, \theta)} = \rho^2 \sin \phi$$

$$3. \int_C \mathbf{f}(\mathbf{r}) ds = \int_a^b \mathbf{f}(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt$$

$$4. \int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{T}(\mathbf{r}(t)) ds = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

$$5. \oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{\partial R} f(x, y) dx + g(x, y) dy = \iint_R \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) da$$

$$6. \oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \right) da$$

$$7. \iint_S f(x, y, z) d\sigma = \iint_{R_{uv}} f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)\| du dv$$

$$8. \iint_S f(x, y, z) d\sigma = \iint_{R_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

$$9. \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_{R_{uv}} \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v) du dv$$

$$10. \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_{R_{xy}} \mathbf{F}(x, y, z(x, y)) \cdot (-z_x, -z_y, 1) dx dy$$

$$11. (i) \nabla \times \nabla h = \mathbf{0}$$

$$(ii) \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$$

$$(iii) \nabla \cdot (h\mathbf{F}) = \nabla h \cdot \mathbf{F} + h \nabla \cdot \mathbf{F}$$

$$(iv) \nabla \times (h\mathbf{F}) = \nabla h \times \mathbf{F} + h \nabla \times \mathbf{F}$$

$$(v) \nabla(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}) = \mathbf{F} \times (\nabla \times \mathbf{G}) + \mathbf{G} \times (\nabla \times \mathbf{F}) + (\mathbf{F} \cdot \nabla)\mathbf{G} + (\mathbf{G} \cdot \nabla)\mathbf{F}$$

$$(vi) \nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) - \mathbf{F} \cdot (\nabla \times \mathbf{G})$$

$$(vii) \nabla \times (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{F}(\nabla \cdot \mathbf{G}) - (\mathbf{F} \cdot \nabla)\mathbf{G} + (\mathbf{G} \cdot \nabla)\mathbf{F} - \mathbf{G}(\nabla \cdot \mathbf{F})$$

$$(viii) \nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$$

$$12. \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dv$$

$$13. \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \int_0^1 t \mathbf{F}(t\mathbf{r}_0 + t(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)) \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) dt$$

$$14. \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \left(\int_{z_0}^z f_2(x, y, z) dz - \int_{y_0}^y f_3(x, y, z_0) dy, - \int_{z_0}^z f_1(x, y, z) dz, 0 \right)$$

$$15. \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

$$16. u(\mathbf{r}) = \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$